

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Crataegan®-Tropfen Wirkstoff: Weißdornextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Crataegan-Tropfen jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 4 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Crataegan-Tropfen und wofür werden diese angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Crataegan-Tropfen beachten?
3. Wie sind Crataegan-Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Crataegan-Tropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND Crataegan-Tropfen UND WOFÜR WERDEN DIESE ANGEWENDET?

Crataegan®-Tropfen

sind ein pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei beginnender Leistungsverminderung des Herzens mit Symptomen wie Abgeschlagenheit und Müdigkeit bei Belastung.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON Crataegan-Tropfen BEACHTEN?

Crataegan-Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von Crataegan-Tropfen sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Crataegan-Tropfen ist erforderlich,

bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot sowie bei Ansammlung von Wasser in den Beinen muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren:

Für Crataegan-Tropfen gibt es keine Indikation für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

Bei Einnahme von Crataegan-Tropfen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Crataegan-Tropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Einnahme von Nahrungsmitteln und Getränken führt zu keiner Beeinflussung der Wirksamkeit des Arzneimittels.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen kann die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Crataegan-Tropfen

Dieses Arzneimittel enthält 43 Gew.-% Ethanol (Alkohol), d.h. bis zu 258mg pro Dosis (15 Tropfen), entsprechend 6,5 ml Bier, 2,2 ml Wein pro Dosis.

Es besteht daher ein gesundheitliches Risiko bei Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit einem erhöhten Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. WIE SIND Crataegan-Tropfen EINZUNEHMEN?

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wenden Sie Crataegan-Tropfen immer genau nach Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung

Erwachsenen:

2 -3 x täglich 15-20 Tropfen

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren:

Für Crataegan-Tropfen gibt es keine Indikation für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren..

Art der Anwendung

CRATAEGAN-Tropfen werden unverdünnt oder mit etwas Wasser verdünnt eingenommen.

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder nach 4 Wochen keine Besserung eintritt, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Crataegan-Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten

Überdosierungserscheinungen sind bisher nicht bekannt geworden. Im Falle extremer Überdosierung empfiehlt sich die Überwachung von Herz- und Kreislauffunktionen.

Wenn Sie die Einnahme von Crataegan-Tropfen vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Crataegan-Tropfen abbrechen

können Ihre Beschwerden wieder auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Crataegan-Tropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Übelkeit wurde beobachtet.

Angaben zur Häufigkeit des Auftretens der Nebenwirkung können nicht gemacht werden.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND Crataegan-Tropfen AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nach Anbruch der Flasche soll Crataegan – Tropfen nicht länger als 1 Jahre verwendet werden.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach Verw. bis: angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Crataegan-Tropfen enthalten

Der Wirkstoff ist alkoholischer Auszug aus Blättern, Blüten und Früchten verschiedener Crataegusarten (Weißdorn)

100 g enthalten 75 g Weißdornextrakt aus Blüten, Blättern und Früchten mit 6 mg oligomere Procyanidine (OPC) pro Gramm; DEV 1: 0,9 – 1,9, Auszugsmittel: Ethanol 49 Gew.-%

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol - Wassergemisch

Gesamtalkoholgehalt: 43 Gew.-%.

1 ml = ca. 24 Tropfen;

1 ml = 0,9g

1 ml enthält 0,4g Ethanol.

Wie Crataegan-Tropfen aussehen und Inhalt der Packung

Crataegan-Tropfen sind eine rotbraune, klare Lösung in Flaschen aus Braunglas mit Verschluss und Tropfer aus Kunststoff.

Packungsgröße: 50 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber:

AUSTROPLANT-ARZNEIMITTEL GmbH

Richard Strauss-Straße 13

A - 1232 Wien

Tel.-Nr.: 01 / 616 26 44 - 64
Fax-Nr.: 01 / 616 26 44 - 851
e-mail: med.servic@peithner.at

Hersteller:
Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co
Richard Strauss-Straße 13
A - 1232 Wien

Z.Nr.: 7868

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im April 2011