

# PROSPAN®

## Hustenliquid



### GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

#### Prospan® Hustenliquid – Flüssigkeit zum Einnehmen

Wirkstoff: Efeublättertrockenextrakt

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Prospan® Hustenliquid jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 1 Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Prospan® Hustenliquid und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Prospan® Hustenliquid beachten?
3. Wie ist Prospan® Hustenliquid einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Prospan® Hustenliquid aufzubewahren?
6. Weitere Angaben

#### 1. WAS IST PROSPAN® HUSTENLIQUID UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Prospan® Hustenliquid ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Schleimlösung bei Husten im Zusammenhang mit Erkältungen.

Prospan® Hustenliquid erleichtert das Abhusten, entspannt die Bronchialmuskulatur und beruhigt so den Husten.

#### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PROSPAN® HUSTENLIQUID BEACHTEN?

**Prospan® Hustenliquid darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder**

gegen andere Pflanzen aus der Familie der Araliengewächse (z.B. Ginseng) oder gegen einen der sonstigen Bestandteile sind.

Prospan® Hustenliquid darf wegen des Gehaltes an Menthol nicht bei Patienten mit Asthma bronchiale oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen, angewendet werden. Die Inhalation von Prospan® Hustenliquid kann zur Bronchokonstriktion führen.

#### Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Prospan® Hustenliquid ist erforderlich

Prospan® Hustenliquid ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.

Bei Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf muss ein Arzt aufgesucht werden

#### Bei Einnahme von Prospan® Hustenliquid mit anderen Arzneimitteln

Es wurden keine Wechselwirkungsstudien durchgeführt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### Bei Einnahme von Prospan® Hustenliquid zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

*Hinweis für Diabetiker*

5 ml Flüssigkeit (1 Beutel) enthalten 1,926 g Sorbitol (Zucker-austauschstoff), das entspricht 0,16 BE (Broteinheiten).

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen werden.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt

#### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Prospan® Hustenliquid

Prospan® Hustenliquid enthält pro Beutel 1,9 g Sorbitol als 70% Sorbitol-Lösung. Bitte nehmen Sie Prospan® Hustenliquid erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie an einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

#### 3. WIE IST PROSPAN® HUSTENLIQUID EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Prospan® Hustenliquid immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

### Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 3 mal täglich 1 Beutel (5 ml).

Kinder von 6 bis 12 Jahren: 2 mal täglich 1 Beutel (5 ml).

Prospan® Hustenliquid ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.

### Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Die Flüssigkeit soll morgens, (mittags) und abends unverdünnt eingenommen werden.

Für Prospan® Hustenliquid wurde eine Verpackung gewählt, die sich mühelos aufreißen und deren Inhalt sich bequem einnehmen lässt. Die genaue Handhabung können Sie der Zeichnung entnehmen.



Abb.1  
Beutel vor Gebrauch leicht durchkneten!




Abb. 2  
Flüssigkeit nach unten drücken und Beutel aufreißen.




Abb. 3  
Beutel zum Mund führen und ausstreifen.

### Dauer der Anwendung:

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, muss ein Arzt aufgesucht werden.

### Wenn Sie eine größere Menge von Prospan® Hustenliquid angewendet haben, als Sie sollten

Bei Überdosierung können Reizungen des Verdauungstrakts und eventuell Erbrechen auftreten. Die Beschwerden sind beim Absetzen des Präparates reversibel.

### Wenn Sie die Einnahme von Prospan® Hustenliquid vergessen haben:

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme wie vom Arzt verordnet oder in der Packungsbeilage beschrieben fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Prospan® Hustenliquid Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem auftreten müssen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 Behandelte von 1.000) werden nach Einnahme von Efeu-haltigen Arzneimitteln Magen-Darm-Beschwerden (wie z.B. Übelkeit, Erbrechen und Durchfall) und sehr selten (betrifft weniger als 1 Behandelten von 10.000) allergische Reaktionen (Atemnot, Hautausschläge, Juckreiz) beobachtet.

## 5. WIE IST PROSPAN® HUSTENLIQUID AUFZUBEWAHREN?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

 Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was Prospan® Hustenliquid enthält:

Der Wirkstoff ist: Efeublättertrockenextrakt

5 ml (1 Beutel) enthalten 35 mg Efeublättertrockenextrakt (Verhältnis Droge:Extrakt 5 – 7,5 : 1; Auszugsmittel: Ethanol 30% (m/m))

Die sonstigen Bestandteile sind: Kaliumsorbat, wasserfreie Zitronensäure, Xanthan-Gummi, Sorbitol-Lösung 70% (E 420, kristallisierend), Aromastoffe, Levomenthol, gereinigtes Wasser.

### Wie Prospan® Hustenliquid aussieht und Inhalt der Packung:

Prospan® Hustenliquid ist eine hellbraune, leicht getrübbte Flüssigkeit zum Einnehmen und ist in Packungen zu 21 Beuteln mit je 5 ml erhältlich.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller



### Zulassungsinhaber:

Sanova Pharma GesmbH  
Haidestraße 4  
A-1110 Wien  
Tel.: +43 1 801 04 - 0  
e-mail: sanova.pharma@sanova.at



### Hersteller:

Engelhard Arzneimittel  
GmbH & Co KG  
D-61138 Niederdorfelden  
Deutschland

Z.Nr.: 1-27294

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Februar 2012.**