

## Gebrauchsinformation

### Reparil-Gel

Z.Nr. 14.243

Hersteller: MADAUS GmbH, Köln, BRD

Vertrieb: Madaus Ges.m.b.H., Wien

### Zusammensetzung:

100 g enthalten:

Aescin 1,0 g

Diethylaminsalicylat 5,0 g

### Eigenschaften und Wirksamkeit

Reparil-Gel ist eine Spezialzubereitung in alkoholischer Grundlage mit Dreifachwirkung: abschwellend, entzündungshemmend und schmerzlindernd.

Aescin in hautdurchgängiger Form verhindert Wasseransammlungen im Gewebe und führt zur Abschwellung des Gewebes. Lokale Schwellungen, die Schweregefühl und Spannungsschmerz verursachen, werden rasch beseitigt. Entzündliche Prozesse werden wirksam bekämpft.

Die Salicylsäureverbindung verstärkt den entzündungshemmenden Effekt und hat eine besonders tiefenwirksame, schmerzlindernde Wirkung.

Reparil-Gel hat außerdem noch folgende Eigenschaften:

Reparil-Gel ist transparent und dringt rasch und vollständig in das erkrankte Gewebe ein.

Reparil-Gel fettet nicht, schmiert nicht und ist deshalb besonders angenehm und sauber anwendbar.

Reparil-Gel kühlt den schmerzenden Bereich, ist hautschonend und auch für empfindliche Hautpartien hervorragend verträglich.

### Anwendungsgebiete

Bei oberflächlichen Venenentzündungen, Krampfadern. Zur Venenpflege nach Injektionen bzw. Infusionen.

Bei Verletzungen mit Prellungen, Verstauchungen (Sportverletzungen), Quetschungen, Blutergüssen und Sehnenscheidenentzündungen.

### Art der Anwendung und Dosierung

Falls nicht anders verordnet, ein- bis mehrmals täglich auf die Haut über dem erkrankten Bereich in dünner Schicht auftragen und verteilen. Einmassieren ist nicht erforderlich, wenn erwünscht, jedoch möglich.

Bei Venenentzündung (Thrombophlebitis) darf Reparil-Gel nicht einmassiert werden.

### Gegenanzeigen

Reparil-Gel soll nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

Nicht auf offene Hautstellen, Schleimhäute und strahlenbehandelte Hautpartien auftragen. In der Schwangerschaft und Stillperiode ist die Anwendung möglich.

### Nebenwirkungen

In sehr seltenen Fällen können allergische Hauterscheinungen auftreten.

### Wechselwirkungen, Gewöhnungseffekte

Bisher nicht bekannt.

### Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

Bitte teilen Sie erste Anzeichen von Nebenwirkungen Ihrem Arzt mit.

Bei Auftreten allergischer Reaktionen sollte die Reparil-Gel-Behandlung abgesetzt werden.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Verfalldatum beachten.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren!

### Packungsgrößen

20 g, 40 g und 100 g

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.

Madaus - Arzneimittel aus Naturstoffen.